

麻疹

麻疹ウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症です。「はしか」とも呼ばれます。

症状や特徴

★主な症状

- ・発熱・咳・鼻水等の風邪症状
- ・発疹

★主な特徴

- ・約10日間の潜伏期間、最初は風邪のような症状。
- ・2～3日熱が続いた後、高熱(39℃以上)とかゆみを伴う発疹が出現。
- ・肺炎や脳炎等の合併症を発症する事もあります。合併症がなければ症状は7～10日で回復します。



感染経路

★空気感染、飛沫感染、接触感染でうつります。感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症します。

- ①空気感染…空气中を漂う病原体を吸い込むことによって生じる感染。
- ②飛沫感染…感染している人のくしゃみや咳で出るしぶきを吸い込むことによる感染。
- ③接触感染…感染している人の唾や鼻汁が手から手へ、あるいはドアノブやつり革などを介して手に付着することなどによる感染。



どうやって予防する？

★予防接種を受ける

麻疹ワクチンを接種することによって95%以上の人々が免疫を獲得できると言われています。また、2回接種することで1回の接種では免疫が付かなかった人の多くに免疫を付けることができます。

*麻疹は感染力が強く、マスクやうがい手洗いのみで防ぐことはできません。



麻疹にかかったら受診は？

発熱に対しては解熱鎮痛剤が用いられますが、特異的な治療はなく、症状を和らげる対症療法のみとなります。

- ・医療機関に電話で伝え、受診の要否や注意点を確認し、その指示に従ってください。
- ・麻疹は感染力が強いので、受診の際は必ずマスクの着用・公共交通機関の利用を避けてください。

麻疹にかかったら学校は？

麻疹は学校保健安全法により第2種感染症に指定されており、「解熱後3日を経過するまで出席停止」と決められています。登校停止感染症としての手続きが必要です。國學院大學ホームページを参照してください。

厚生労働省 HP 麻疹について

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html